

DECISION EN EL CONTROL DE CHINCHES EN SOJA SEGUN ESTADOS FENOLOGICOS, ESPACIAMIENTOS ENTRE HILERAS Y ESPECIES DE CHINCHES FITOFAGAS



PLAGA	N D E (n° individuos/m) (a)												
	R3 – R4 Formación de Vainas				R5 Formación de Granos				R6 – 7 (b) Después de Grano Lleno				
	70 cm	52 cm	42 cm	35 cm	70 cm	52 cm	42 cm	35 cm	70 cm	52 cm	42 cm	35 cm	
“Chinche de la alfalfa” <i>Piezodorus guildinii</i>	0,6	0,4-0,5	0,3-0,4	0,3	1	0,7	0,6	0,5	3	2	1,7	1,5	
“Chinche verde” <i>Nezara viridula</i>	0,8-1	0,7	0,6	0,5	2	1,5	1,2	1	5	3-4	2,8	2,5	
“Alquiche” <i>Edessa mediatubunda</i> (valores estimados)	1,5	1,1	0,9	0,7-0,8	3	2,2	1,8	1,5	7-8	5,5	4,5	3,5-4	
“Chinche de los cuernos” <i>Dichelops furcatus</i> (valores estimados)	2	1,5	1,2	1	4	3	2,5	2	10	7,5	6	5	

(a) En caso de mezcla de chinches, prorratear valores; (b) En soja para semilla los umbrales en R6-7 son los mismos que en R5.